

CBDCA+GEM+BEV併用療法

カルボプラチン	AUC 5	day1
ジェムザール	800mg/m ²	day1, 8
アバスチン	15mg/kg	day1

適応： 非小細胞肺癌(非扁平上皮)

審査日： 2019年 10月 22日

催吐リスク：

MEC

承認日： 2019年 10月 22日

血管外漏出リスク：

炎症性

1サイクル期間：**21日間**

Rp	時間	薬剤	投与方法	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	~	day21
①	プライミング用	生理食塩水50ml	点滴静注		●							●		
②	9:00	イメドカプセル125mg	内服		●									
③	10:00	ナゼアOD錠0.1mg 1錠	内服		●							●		
④	10:00~10:30	生理食塩水100ml+デキサート4.95mg	点滴静注	30分	●									
⑤	10:00~10:30	生理食塩水100ml+デキサート6.6mg	点滴静注	30分								●		
⑥	10:30~11:00	生理食塩水100ml+ジェムザール	点滴静注	30分	●							●		
⑦	11:00~12:00	5%ブドウ糖液250ml+カルボプラチン(合計250ml)	点滴静注	60分	●									
⑧	12:00~12:05	生理食塩水50ml	点滴静注	5分	●									
⑨	12:05~13:35*	生理食塩水100ml+アバスチン(合計100ml)	点滴静注	90分*	●									
⑩	フラッシュ用	生理食塩水50ml	点滴静注		●							●		
⑪	9:00	イメドカプセル80mg	内服			●	●							
⑫	9:00	デカドロン錠4mg 1錠	内服			●	●	●						

* 初回 90分→2回目 60分→3回目以降 30分

プレメディケーション	特になし
ポストメディケーション	特になし
投与・調整時に注意する点	ジェムザールは1回の点滴を60分以上かけて行くと、骨髄抑制が増強する可能性がある。注入速度に関連して注射部位反応(血管痛)出現する可能性があるため、投与前・投与中に注射部位を温かいタオル等で温める。

【根拠となる論文】