

# CBDCA+PEM併用療法

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| カルボプラチン | AUC 5    | day1 |
| アリムタ    | 500mg/m2 | day1 |

適応： 非小細胞肺癌(非扁平上皮)

催吐リスク： **MEC**

血管外漏出リスク： **炎症性**

審査日： 2019年 10月 22日

承認日： 2019年 10月 22日

1サイクル期間： **21日間**

| Rp | 時間          | 薬剤                            | 投与方法 | 投与時間 | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6 | day7 | day8 | ～ | day21 |
|----|-------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-------|
| ①  | プライミング用     | 生理食塩水50ml                     | 点滴静注 |      | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ②  | 9:00        | イメンドカプセル125mg 1Cap            | 内服   |      | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ③  | 10:00       | ナゼアOD錠0.1mg 1錠                | 内服   |      | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ④  | 10:00～10:30 | 生理食塩水100ml+デキサート4.95mg        | 点滴静注 | 30分  | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ⑤  | 10:30～10:40 | 生理食塩水100ml+アリムタ               | 点滴静注 | 10分  | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ⑥  | 10:40～11:40 | 5%ブドウ糖液250ml+カルボプラチン(合計250ml) | 点滴静注 | 60分  | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ⑦  | フラッシュ       | 生理食塩水50ml                     | 点滴静注 |      | ●    |      |      |      |      |      |      |      |   |       |
| ⑧  | 9:00        | イメンドカプセル80mg 1Cap             | 内服   |      |      | ●    | ●    |      |      |      |      |      |   |       |
| ⑨  | 9:00        | デカドロン錠4mg 1錠                  | 内服   |      |      | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |   |       |

|              |                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プレメディケーション   | 葉酸：本剤初回投与の7日以上前から葉酸としてパンビタン末を1日1回1g連日経口投与する。なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。<br>ビタミンB12：本剤初回投与の少なくとも7日前に、シアノコバラミン注1000μgを筋肉内投与する。その後、本剤投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与する。 |
| ポストメディケーション  | 投与翌日から経口にてデキサメタゾン4mgを3日間継続。                                                                                                                                                             |
| 投与・調整時に注意する点 | 特になし                                                                                                                                                                                    |

## 【根拠となる論文】

J Clin Oncol. 2009 Jul 1;27(19):3217–24. 2009.Grønberg BH et al; Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer.