

# CBDCA+S-1+BEV併用療法

カルボプラチン	AUC 5	day1
エスワンタイホウ	BSA 1.5m2以上:120mg/day BSA 1.25以上1.5m2未満:100mg/day BSA 1.25m2未満:80mg/day	day1~14
アバスチン	15mg/kg	day1

適応: 非小細胞肺癌(非扁平上皮)

審査日: 2019年 10月 22日

承認日: 2019年 10月 22日

催吐リスク: **MEC**

血管外漏出リスク: **炎症性**

1サイクル期間: **28日間**

Rp	時間	薬剤	投与方法	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	~	day14	~	day28
①	プライミング用	生理食塩水50ml	点滴静注		●									
②	9:00	イメンドカプセル125mg	内服		●									
③	10:00	ナゼアOD錠0.1mg 1錠	内服		●									
④	10:00~10:30	生理食塩水100ml+デキサート4.95mg	点滴静注	30分	●									
⑤	10:30~11:30	5%ブドウ糖液250ml+カルボプラチン(合計250ml)	点滴静注	60分	●									
⑥	11:30~11:35	生理食塩水50ml	点滴静注	5分	●									
⑦	11:35~13:05*	生理食塩水100ml+アバスチン(合計100ml)	点滴静注	90分*	●									
⑧	フラッシュ用	生理食塩水50ml	点滴静注		●									
⑨	9:00	イメンドカプセル80mg	内服			●	●							
⑩	9:00	デカドロン錠4mg 1錠	内服			●	●	●						
⑪	朝夕食後	エスワンタイホウOD錠	内服		●	●	●	●	●	●	~	●		

\* 初回 90分→2回目 60分→3回目以降 30分

プレメディケーション	特になし
ポストメディケーション	特になし
投与・調整時に注意する点	S-1は腎機能障害時に減量が必要

【根拠となる論文】

