

## VNR+GEM併用療法

ナベルピン	25mg/m <sup>2</sup>	day1, 8
ジェムザール	800mg/m <sup>2</sup>	day1, 8

適応： 非小細胞肺癌

審査日： 2019年 10月 22日

催吐リスク：

**LEC**

承認日： 2019年 10月 22日

血管外漏出リスク：

**壊死性**

1サイクル期間： **21日間**

Rp	時間	薬剤	投与方法	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	～	day21
①	プライミング用	生理食塩水50ml	点滴静注		●							●		
②	10:00	ナゼアOD錠0.1mg 1錠	内服		●							●		
③	10:00～10:30	生理食塩水100ml+デキサート6.6mg	点滴静注	30分	●							●		
④	10:30～10:35	生理食塩水50ml+ナベルピン	点滴静注	5分	●							●		
⑤	10:35～11:00	生理食塩水250ml	点滴静注	25分	●							●		
⑥	11:00～11:30	生理食塩水100ml+ジェムザール	点滴静注	30分	●							●		
⑦	フラッシュ用	生理食塩水50ml	点滴静注		●							●		

プレメディケーション	なし
ポストメディケーション	なし
投与・調整時に注意する点	ナベルピンはpH3.3～3.8で酸性であるため強い血管刺激性を有する。血管炎・静脈炎を予防するために投与は10分以内で終了し、投与後は補液により管内の薬液を十分に洗い流すことが望ましい。ジェムザールは1回の点滴を60分以上かけて行くと、骨髄抑制が増強する可能性がある。注入速度に関連して注射部位反応(血管痛)出現する可能性があるため、投与前・投与中に注射部位を温かいタオル等で温める。

### 【根拠となる論文】

J Clin Oncol. 2003 Aug 15;21(16):3025-34. Gridelli C et al; Gemcitabine plus vinorelbine compared with cisplatin plus vinorelbine or cisplatin plus gemcitabine for advanced non-small-cell lung cancer: a phase III trial of the Italian GEMVIN Investigators and the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group.