

nab-PAC単剤療法

アブラキサン 100mg/m² day1, 8, 15

適応: 非小細胞肺癌

審査日: 2019年 11月 22日

承認日: 2019年 11月 22日

催吐リスク:

LEC

血管外漏出リスク:

壊死性

1サイクル期間:

21日間

Rp	時間	薬剤	投与方法	投与時間	day1	day2	day3	day4	~	day8	~	day15	~	day21
①	プライミング用	生理食塩水50ml	点滴静注		●					●		●		
②	10:00	ナゼアOD錠0.1mg 1錠	内服		●					●		●		
③	10:00~10:30	生理食塩水40ml+アブラキサン	点滴静注	30分	●					●		●		
④	フラッシュ用	生理食塩水50ml	点滴静注		●					●		●		

プレメディケーション	特になし
ポストメディケーション	特になし
投与・調整時に注意する点	アブラキサンは生理食塩水で溶解、他の薬剤等との配合または静注ラインでの同時注入は避けること、インラインフィルターを使用しないこと、また大変泡立ちやすく、振盪を避けること、投与時は表面張力の低下により1滴あたりの大きさが小さくなるため、滴下速度の調整が必要。

【根拠となる論文】

Shinya Sakata et.al. Phase II trial of weekly nab-paclitaxel for previously treated advanced non-small cell lung cancer: Kumamoto thoracic oncology study group (KTOSG) trial 1301. Lung cancer 99 (2016) 41-45.