

免 TECENTRIQ+BEV併用療法

アバスチン 15mg/kg day1
 テセントリク 1,200mg/body day1

適応： 非小細胞肺癌(非扁平上皮)

審査日： 2019年 10月 22日

承認日： 2019年 10月 22日

催吐リスク： **最小**

血管外漏出リスク： **非炎症性**

1サイクル期間： **21日間**

Rp	時間	薬剤	投与方法	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	~	day21
①	プライミング用	生理食塩水50ml	点滴静注		●									
②	10:00~10:30	生理食塩水250ml+テセントリク	点滴静注	30分	●									
③	10:30~10:35	生理食塩水50ml	点滴静注	5分	●									
④	10:35~11:05	生理食塩水100ml+アバスチン(合計100ml)	点滴静注	30分	●									
⑤	フラッシュ用	生理食塩水50ml	点滴静注		●									

プレ Medikation	特になし
ポスト Medikation	特になし
投与・調整時に注意する点	インラインフィルターを用いて投与すること。

【根拠となる論文】

Mark A. Socinski, M.D., Robert M. Jotte, M.D., Federico Cappuzzo, M.D. et al., for the IMpower150 Study Group. Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC. N Engl J Med 2018; 378:2288-2301